

Validering van een stadieringsmodel voor angststoornissen.



Wicher Bokma

Vrijdag 13-10-2017

NEDKAD invitational
conference

art by Sujith Rathnayake

Disclosure belangen spreker

(potentiële) belangenverstrengeling	geen
Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven	geen
<ul style="list-style-type: none">• Sponsoring of onderzoeksgeld• Honorarium of andere (financiële) vergoeding• Aandeelhouder• Andere relatie, namelijk ...	<ul style="list-style-type: none">• geen• geen• geen• geen



- Ik pas zelf klinische stadiering toe bij psychiatrische stoornissen.
- Ik wil in de toekomst klinische stadiering toepassen bij psychiatrische stoornissen.

Angststoornissen

- Heterogeniteit in beloop





Fig. 1. Identified symptom course trajectories of anxiety disorders using linear Latent Growth Mixture Modelling (LGMM) (n = 713).

Note: Class 1: Improvement; Class 2: Persistence; Class 3: Mild Deterioration; Class 4: Severe Deterioration

Spinhoven, P. et al. 2016. *Journal of Anxiety Disorders*.

Klinische stadiering

T and N



Richtlijn psychiatrische diagnostiek

Tweede, herziene versie, 2015

*M.W. Hengeveld (voorzitter), A.T.F. Beekman, R.J. Beerthuis, L. Hoekstra,
H.J.C. van Marle, P. Naarding, T. van Oeffelt (richtlijnwerkgroep),
J.W. Hagemeijer en K. Venhorst (projectondersteuning)*

Diagnostiek

Aannames

- Vroege stadia:
 - Minder gevorderde symptomatologie
 - Lange termijn prognose gunstiger
- Behandelingen effectiever
- Gunstiger kosten-baten ratio


Scott J. et al. *Br J Psychiatry*. 2013.

Methode

- Vroege stadia angststoornissen:
 - Minder gevorderde symptomatologie?
 - Lange termijn prognose gunstiger?
- Behandelingen effectiever
- Gunstiger kosten-baten ratio

Bokma WA, Batelaan NM, Hoogendoorn AW, Penninx BWJM, van Balkom ALJM.
Predicting the six-year course of Anxiety Disorders using simple clinical characteristics: validation of a staging model. (under review)

beslisboom



resultaten

- Vroege stadia angststoornissen:
 - Minder gevorderde symptomatologie?

Stadium	0	1a	1b	2a	2b	3a	3b	4a	4b
n (totaal =2352)	574	371	170	159	268	95	246	155	314

Angstsymptomen (BAI)

Sociale vermijding (FQ)

Agorafobische vermijding
(FQ)

Piekeren (PSWQ)

Lichamelijke


angstsensaties (MASQ)

Depressie symptomen
(IDS)

Functieverlies (WHO-DAS
II)


resultaten

- Vroege stadia angststoornissen:
 - Lange termijn prognose gunstiger?



resultaten

- Vroege stadia angststoornissen:
 - Lange termijn prognose gunstiger?



conclusies

- Stadieringsmodel voor angststoornissen:
 - stadia weerspiegelen ernst van symptomen
 - hogere stadia hebben een ongunstiger beloop, lage stadia gunstiger
- Behandelingen effectiever?
- Gunstiger kosten-baten ratio?




- Ik wil in de toekomst klinische stadiering toepassen bij psychiatrische stoornissen.

dank



Dr. Neeltje Batelaan



Dr. Adriaan Hoogendoorn



Prof. Dr. Brenda Penninx



Prof. Dr. Anton van Balkom